

Gonorrea

“drip” o “clap”

La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) muy común. Es causada por gérmenes que se transmiten de una persona a otra durante la actividad sexual, incluyendo las relaciones sexuales vaginales, anales y orales. También puede transmitirse de madre a hijo durante el parto. Una persona infectada debe ser tratada de inmediato. De no tratarse, la gonorrea puede causar un tipo de artritis o infertilidad más tarde en la vida.

Indicios y síntomas

La mayoría de las mujeres con gonorrea no presentan síntomas. Una mujer puede tener un flujo vaginal o una leve sensación de ardor al orinar. A menudo esto no se nota debido a que es muy leve. Una mujer puede infectar a sus parejas incluso si no presenta síntomas.

La gonorrea no tratada puede causar enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) en las mujeres. Los gérmenes se adentran tanto en el organismo que causan serias lesiones en el sistema reproductor.

En los hombres, los síntomas por lo general aparecen entre 2 y 8 días después de la relación sexual. Muchas veces tienen micción dolorosa y les sale pus del pene. También pueden sentir una sensación de ardor. Incluso si no tiene síntomas, un hombre puede infectar a sus parejas.

Si una persona se contagia de gonorrea a través del sexo oral, los gérmenes pueden causar sequedad, dolor o picazón de garganta. Flujo rectal y picazón son síntomas de la gonorrea anal.

Examen

Muchas clínicas realizan un análisis de orina o examinan muestras del flujo. Debido a que hay diferentes tipos de gonorrea, la muestra se analizará para determinar qué medicamento es el mejor. Las personas también deben someterse a análisis de clamidia al mismo tiempo,

ya que la mitad de las personas que tienen gonorrea también tienen clamidia.

Tratamiento

Su doctor le dará una receta para antibióticos. Pueden ser inyectables o en pastillas. Tome todos sus medicamentos, incluso si comienza a sentirse mejor. Es importante que informe a su doctor si está embarazada, porque podría recomendarle otro medicamento. Todas sus parejas deben ser tratadas, de lo contrario, volverán a tener gonorrea.

Para evitar la ceguera en bebés, se colocan gotas en los ojos de los bebés inmediatamente después del parto.

Prevención

- **Conozca a sus parejas**—vaya con ellas a las evaluaciones de las ETS.
- **Use preservativos correctamente cada vez que tenga relaciones sexuales.**
- **Tenga menos parejas.** Mientras más parejas tenga, mayor será su riesgo de contraer gonorrea.
- **Las pastillas para el control de la natalidad no previenen la infección.**

Aprenda más acerca de la gonorrea

Si tiene preguntas o necesita más información, póngase en contacto con su médico, departamento de salud local, clínica comunitaria o llame a la Línea Directa Nacional sobre ETS al **1-800-227-8922**.

Este documento se encuentra disponible en otros formatos para personas con discapacidades a solicitud del interesado. Para presentar una solicitud, llame al 1-800-525-0127 (TTY/TDD 1-800-833-6388).





Dear Colleague,

The Washington State Department of Health (DOH) provides print-ready files (PDFs) of health education materials. To ensure that the original quality of the piece is maintained, please read and follow the instructions below and the specifications included for professional printing.

- **Use the latest version.** DOH materials are developed using the most current information available, are checked for clinical accuracy, and are field tested with the intended audience to ensure they are clear and readable. DOH programs make periodic revisions to educational materials, so please check this web site to be sure you have the latest version. DOH assumes no responsibility for the use of this material or for any errors or omissions.
- **Do not alter.** We are providing this artwork with the understanding that it will be printed without alterations and copies will be free to the public. Do not edit the text or use illustrations or photographs for other purposes without first contacting us. Please do not alter or remove the DOH logo, publication number or revision date. If you want to use a part of this publication for other purposes, contact the Office of Health Promotion first.
- **For quality reproduction:** Low resolution PDF files are intended for black and white or color desktop printers. They work best if you are making only one or two copies. High resolution PDF files are intended for reproducing large quantities and are set up for use by professional offset print shops. The high resolution files also include detailed printing specifications. Please match them as closely as possible and insist on the best possible quality for all reproductions.

If you have questions, contact:
Office of Health Promotion
P.O. Box 47833 Olympia, WA 98504-7833
(360) 236-3736

Sincerely,
Health Education Resource Exchange Web Team